

# MEMENTO GENOM



2026



GRUPO



União Química  
farmacêutica nacional S/A

# Nossa História

“O **Grupo União Química** possui a inovação em seu DNA. Uma empresa que inova em cada nova etapa, no desenvolvimento de seus produtos e na condução de seus negócios, reforçando cada vez mais seu comprometimento com a saúde do nosso país”

*Fernando de Castro Marques*

Presidente

A **Genom Oftalmologia** ocupa a primeira posição entre os laboratórios nacionais neste segmento tanto em dados de faturamento (IQVIA) como em prescrição (Close-up). Com um vasto portfólio para o tratamento de doenças crônicas e agudas, a **Genom Oftalmologia** conta com forte reconhecimento da classe médica e das sociedades de Oftalmologia. Parcerias com outras empresas nacionais e internacionais fazem parte da estratégia da **Genom Oftalmologia** com foco em sempre proporcionar tratamentos de ponta e acesso facilitado à população brasileira.

A **Genom Ginecologia** é a maior fabricante de contraceptivos orais da América Latina, reforçando sua atuação com a aquisição de uma planta da Bayer em 2022. Especializada em hormônios orais, a **Genom** exporta para aproximadamente 30 países da América Latina e Ásia. Além dos contraceptivos hormonais, fornece também suplementos nutricionais, reposição hormonal e tratamento para sangramento uterino anormal.

A **Genom Sistema Nervoso Central** oferece tratamentos de qualidade e acesso à população, através de medicamentos importantes para a melhora do bem-estar e o cuidado com a saúde mental. O portfólio inclui medicamentos para tratar doenças como depressão, ansiedade, insônia, alcoolismo, espasticidade, esquizofrenia e transtorno bipolar. Além de Cognicx®, um suplemento alimentar que auxilia na melhora cognitiva do paciente.

A **Genom Dor** possui um portfólio destinado ao tratamento de todos os níveis de dor. Entre os medicamentos estão anti-inflamatórios, suplementos alimentares para saúde óssea, saúde articular e analgésicos. É a linha ideal para te acompanhar em todos os momentos.

A linha **Genom Dermatologia** possui medicamentos, dermocosméticos e nutracêuticos seguros, eficazes e acessíveis. Acreditamos que ao oferecer produtos inspirados nas reais necessidades dos pacientes, cuidamos da saúde da pele das pessoas de forma genuína, de dentro pra fora e de fora pra dentro.

A linha **Genom Pediatria** nasce com o compromisso de levar para os pediatras – “eficácia e segurança com empatia”. Ondset Solução é a grande inovação da linha - a primeira ondansetrona líquida pensada para a infância, com especial atenção à forma farmacêutica e aspectos sensoriais – sem sabor artificial e sem gosto residual, para favorecer a administração, garantir a segurança e adesão do pequeno paciente.

Pensando em expandir o acesso à saúde, a **Genom** inicia sua trajetória na **Cardiologia e Apresolina** **marca esse início** com o compromisso de ampliar a disponibilidade e acesso de importantes terapias para a saúde cardiovascular para todos os brasileiros.



# Nossas Fábricas

Unidade Fabril em **Brasília, DF**



Unidade Fabril em **Brasília, DF** BTHEK



Unidade Fabril em **São Paulo** - Genom



Unidade Fabril em **Embu-Guaçu, SP**



Unidade Fabril em **Pouso Alegre, MG**



# Nossas Fábricas

Unidade Fabril em **Guarulhos**, SP Inovat



Unidade Fabril em **Taboão da Serra**, SP - Anovis



Unidade Fabril em **Georgia**, EUA



Unidade Fabril em **São Paulo**, Laboratil



Centro Logístico e Parque Gráfico em **Pouso Alegre**, MG



Unidade Fabril em **Montes Claros**, MG



# *Pesquisa e Desenvolvimento*



Investimento contínuo em P&D e em Biotecnologia, garantindo o **crescimento sustentável**.

.....



**Criação de produtos** que atendam às necessidades da população e do mercado.


.....



**Parcerias com instituições públicas e privadas:** Instituto Butantã, PUC-RS e UFMG.

# Índice

Especializada em produtos de prescrição médica, a **Unidade de Negócio Genom**, parte do **Grupo União Química**, atua em diversas áreas da medicina, oferecendo produtos de alta qualidade na Oftalmologia, Ginecologia, Ortopedia, Neurologia, Psiquiatria, Dermatologia e Cardiologia.



*Memento*

.....

# Oftalmología

.....

GENOM

Blephagel<sup>®</sup>

Britens<sup>®</sup>

Britens<sup>®</sup> LC

Cetrolac<sup>®</sup>

Cetrolac MD<sup>®</sup>

Cyclocort<sup>®</sup>

DEWS<sup>®</sup>

Diamox<sup>®</sup>

Drusolol<sup>®</sup>

Drusolol<sup>®</sup> LC

DuoGlau<sup>®</sup>

Glaub<sup>®</sup>

Glaub MD<sup>®</sup>

Glaucotrat<sup>®</sup>

Hyabak<sup>®</sup>

Lacrilfilm<sup>®</sup>

L-CAPS D+<sup>®</sup>

Luvis Gold<sup>®</sup>

Luvis S<sup>®</sup>

Maxinom<sup>®</sup>

Octifen<sup>®</sup>

Ocupress<sup>®</sup>

Opti<sup>®</sup>

Ster<sup>®</sup>

Ster MD

Slow-K

Thealoz<sup>®</sup> Duo

Tobracort<sup>®</sup>

<<< PÁGINA INICIAL

# Blephagel®

água, poloxamer 188, PEG-90

**Gel hipoalergênico para higiene das pálpebras e dos cílios.**



## Apresentação:

Bisnaga com 40 g e 100 compressas.

## Recomendação de Uso:

Em média 2x por dia, de manhã, noite, ou quantas vezes seja necessária a limpeza das pálpebras.

## Indicação<sup>1</sup>:

Específico para higiene diária das pálpebras e cílios, com ação demaquilante, adequado para usuários de lentes de contato.

Referências: 1. Folheto do produto Blephagel®.  
BLEPHAGEL®, Nº do processo: 25351.683806/2010-61

# Britens®

tartarato de brimonidina 0,2% +  
maleato de timolol 0,5%

**Colírio antiglaucomatoso.**



## Apresentação:

Frascos com 5 mL e 10 mL.

## Posologia:

1 gota 2x ao dia.

## Indicação<sup>1</sup>:

Redução da pressão intraocular elevada no glaucoma crônico de ângulo aberto ou hipertensão ocular que não respondem à monoterapia.

Referências: 1. Bula do produto Britens®.

<<< PÁGINA INICIAL

# Britens® LC

tartarato de brimonidina 0,2% +  
maleato de timolol 0,5%  
**livre de conservantes**

**Colírio antiglaucomatoso  
Livre de conservantes.**



## Apresentação:

Frascos com 5 mL e 10 mL.

## Recomendação de Uso:

1 gota 2x ao dia.

## Indicação<sup>1</sup>:

Redução da pressão intraocular elevada no glaucoma crônico de ângulo aberto ou hipertensão ocular que não responde à monoterapia.

Referências: 1. Bula do produto Britens® LC.

# Cetrolac®

trometamol cetorolaco 5 mg/mL

**Anti-inflamatório oftálmico não hormonal.**



MEDICAMENTO  
REFERÊNCIA<sup>1</sup>

## Apresentação:

Frasco com 5 mL.

## Posologia:

1 gota 4x ao dia.

## Indicação<sup>2</sup>:

Alívio dos sinais e sintomas da conjuntivite alérgica, profilaxia da inflamação em cirurgias oculares, tratamento da dor ocular.

Referências: 1. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/> 2. Bula do produto Cetrolac®.

<<< PÁGINA INICIAL

# Cetrolac MD<sup>®</sup>

trometamol cetorolaco 4 mg/mL

○ **Anti-inflamatório oftálmico não hormonal.**

**USO  
PEDIÁTRICO  
ACIMA DE  
3 ANOS**



## Apresentação:

Frascos com 5 mL e 10 mL.

## Posologia:

1 gota 4x ao dia.

## Indicação<sup>1</sup>:

Redução da dor, sensação de corpo estranho nos olhos, fotofobia, ardência e lacrimejamento após cirurgia refrativa da córnea.

Referências: 1. Bula do produto Cetrolac MD<sup>®</sup>.

# Cylocort<sup>®</sup>

cloridrato de ciprofloxacino 3,5 mg/mL +  
dexametasona 1 mg/mL

○ **Antibiótico oftálmico.**

**MEDICAMENTO  
REFERÊNCIA<sup>1</sup>**



## Apresentação:

Frascos com 5 mL e bisnaga com 3,5 g de pomada.

## Posologia:

Colírio: 1-2 gotas 4/4 horas.

Pomada: aplicar pequena quantidade 3-4x ao dia ou a critério médico.

## Indicação<sup>1</sup>:

Bactericida de amplo espectro e anti-inflamatório indicado em: pós-operatório de catarata, blefarconjunvites, blefarites e conjuntivites.

Referências: 1. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/> 2. Bula do produto Cylocort<sup>®</sup>.

<<< PÁGINA INICIAL

# DEWS®

carmelose sódica 5 mg/mL  
sem conservantes



○ **Lágrima artificial.**



**Apresentação:**  
Frasco com 10 mL.


**Posologia:**  
1 gota em cada olho sempre que necessário.

**Indicação:**  
Melhorar a irritação, ardor e secura ocular.

DEWS® (carmelose sódica 5 mg/mL) É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

# Diamox®

acetazolamida 250 mg



○ **Antiglaucomatoso oral.**



**Apresentação:**  
Blisters com 30 comprimidos.

**Posologia:**  
1 comprimido a cada 4 horas.

**Indicação<sup>2</sup>:**  
Tratamento adjuvante de edema em insuficiência cardíaca congestiva, edema induzido por medicamentos, epilepsias, glaucoma primário de ângulo aberto, glaucoma secundário a outros transtornos do olho. Uso pré-operatório em glaucoma primário de ângulo fechado.

Referências: 1. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/> 2. Bula do produto Diamox®.

<<< PÁGINA INICIAL

# Drusolol®

cloridrato de dorzolamida 2% +  
maleato de timolol 0,5%

## Colírio antiglaucomatoso.



### Apresentação:

Frasco com 5 mL.

### Posologia:

1 gota 2x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Redução da pressão intraocular elevada no glaucoma de ângulo aberto, pseudoesfoliativo, glaucoma secundário de ângulo aberto, quando o tratamento combinado for adequado.

Referências: 1. Bula do produto Drusolol®.

# Drusolol® LC

cloridrato de dorzolamida 2% +  
maleato de timolol 0,5%  
**livre de conservantes**

## Colírio antiglaucomatoso Livre de conservantes.



### Apresentação:

Frasco com 5 mL.

### Posologia:

1 gota 2x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Redução da pressão intraocular elevada no glaucoma de ângulo aberto, pseudoesfoliativo, glaucoma secundário de ângulo aberto, quando o tratamento combinado for adequado.

Referências: 1. Bula do produto Drusolol® LC.

<<< PÁGINA INICIAL

# Duoglau<sup>®</sup>

Bimatoprost 0,3mg/mL +  
Maleato de Timolol 0,5mg/mL  
**Livre de Conservantes**

## Colírio antiglaucomatoso (Análogo de Prostaglandina).



### Apresentação:

Frasco com 3 mL.

### Posologia:

1 gota em cada olho afetado, 1x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Para o tratamento de pacientes com glaucoma ou que apresentam hipertensão ocular (pressão nos olhos aumentada).

Referências: 1. Bula do produto DUOGLAU<sup>®</sup>.

# Glaub<sup>®</sup>

tartarato de brimonidina 0,2%

## Colírio antiglaucomatoso.



### Apresentação:

Frasco com 5 mL.

### Posologia:

1 gota 3x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Tratamento do glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular.

Referências: 1. Bula do produto Glaub<sup>®</sup>.

<<< PÁGINA INICIAL

# Glaub MD<sup>®</sup>

tartarato de brimonidina 0,1%

## Colírio antiglaucomatoso.



### Apresentação:

Frasco com 5 mL.

### Posologia:

1 gota 2x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Tratamento do glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular.

Referências: 1. Bula do produto Glaub MD<sup>®</sup>.

# Glaucotrat<sup>®</sup>

maleato de timolol 0,5%

## Colírio antiglaucomatoso.



### Apresentação:

Frasco com 5 mL.

### Posologia:

1 gota 2x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Redução da pressão intraocular elevada. terapia concomitante no glaucoma pediátrico inadequadamente controlado com outra terapia antiglaucomatosa.

Referências: 1. Bula do produto Glaucotrat<sup>®</sup>.



# Hyabak®

hialuronato de sódio 0,15%  
sem conservantes

**Lágrima Artificial referência à base de hialuronato de sódio mais prescrita pelos oftalmologistas.<sup>1</sup>**



## Apresentação:

Frasco com tecnologia ABAK 10 mL - 300 gotas calibradas.

## Recomendação de Uso:

1 gota em cada olho sempre que necessário.

## Indicação<sup>1</sup>:

Lubrificação e hidratação dos olhos e lentes de contato. Pode ser utilizado com lentes de contato, facilitando sua colocação e retirada, proporcionando conforto imediato.

Referências: 1. Close up MAT Maio 2025  
HYABAK®: registro 80424140002

# Lacrifilm®

carmelose sódica  
5 mg/mL

**Lágrima artificial.**



## Apresentação:

Frascos com 10 mL e 15 mL.

## Posologia:

1 a 2 gotas no olho afetado, sempre que necessário.

## Indicação:

Melhorar a irritação, ardor e secura ocular.

LACRIFILM® (carmelose sódica 5 mg/mL) É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

<<< PÁGINA INICIAL

# L-CAPS D+®

Ômega 3 (TG), vitaminas e minerais

## Suplementação vitamínica.



### Apresentação:

Blisters com 60 cápsulas moles.

### Recomendação de Uso:

Para adultos (maiores ou igual a 19 anos), consumir 2 cápsulas 1x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Suplemento específico para aliviar os sintomas do olho seco.

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.  
Referências: 1. Downie LE, Ng SM, Lindsay KB, Akpek EK. Omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids for dry eye disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Dec 18;12(12):CD011016.

# Luvis Gold®

luteína e zeaxantina, vitamina C, vitamina E, zinco e cobre

## Suplementação vitamínica para a saúde dos olhos.



### Apresentação:

Blisters com 60 cápsulas moles.

### Recomendação de Uso:

Para adultos (maiores ou igual a 19 anos), consumir 2 cápsulas ao dia, após refeição.

### Indicação<sup>1</sup>:

Suplemento vitamínico para Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI).

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.  
Referências: 1. Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA. 2013 May 15;309(19):2005-15.

<<< PÁGINA INICIAL

# Luvis S<sup>®</sup>

luteína, zeaxantina, ômega 3,  
trans-resveratrol, vitaminas, minerais  
proantocianidinas de semente de uva

## Suplementação vitamínica para a saúde dos olhos.



### Apresentação:

Blistre com 30 e 60 cápsulas moles.

### Recomendação de Uso:

Para adultos (maiores ou igual a 19 anos), consumir 1 cápsula ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Suplemento vitamínico para Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI).

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.

Referências: 1. Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA. 2013 May 15.309(19):2005-15.

# Maxinom<sup>®</sup>

dexametasona 1 mg/mL + sulfato de neomicina 3,5 mg/  
mL + sulfato de polimixina B 6000 UI/mL

## Antibiótico oftálmico.



USO ADULTO  
E PEDIÁTRICO  
ACIMA DE  
2 ANOS

### Apresentação:

Frasco com 5 mL e bisnaga com 3,5 g de pomada.

### Posologia:

Colírio: 1 gota a cada 4 horas.

Pomada: 3 a 4x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Condições inflamatórias oculares que respondam aos esteróides e onde exista infecção bacteriana ocular ou risco de infecção, uveíte anterior crônica, traumas corneanos e corpo estranho, queimadura química, térmica ou por radiação.

Referências: 1. Bula do produto Maxinom<sup>®</sup>.

<<< PÁGINA INICIAL

# Octifen®

fumarato de cetotifeno 0,25 mg/mL

○ **Antialérgico ocular.**



**USO PEDIÁTRICO**  
ACIMA DE 3 ANOS

**MEDICAMENTO REFERÊNCIA<sup>1</sup>**

**Apresentação:**  
Frasco com 5 mL.

**Posologia:**  
1 gota 2x ao dia.

**Indicação<sup>2</sup>:**  
Tratamento e prevenção de sinais e sintomas da conjuntivite alérgica.

Referências: 1. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/> 2. Bula do produto Octifen®

# Ocupress®

cloridrato de dorzolamida 2%

○ **Colírio antiglaucomatoso**



**MEDICAMENTO REFERÊNCIA<sup>1</sup>**

**Apresentação:**  
Frasco com 5 mL.

**Posologia:**  
1 gota 3x ao dia ou conforme recomendação médica.

**Indicação<sup>2</sup>:**  
Tratamento da pressão intraocular elevada: hipertensão ocular, glaucoma de ângulo aberto, glaucoma pseudoesfoliativo, outros glaucomas secundários de ângulo aberto, como adjuvantes a betabloqueadores, monoterapia em pacientes não responsivo ou com contraindicação a betabloqueadores.

Referências: 1. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/> 2. Bula do produto Ocupress®

<<< **PÁGINA INICIAL**

# Opti®

Cloridrato de Olopatadina 2,2mg/mL

○ **Antialérgico ocular.**

**USO  
PEDIÁTRICO**  
ACIMA DE  
3 ANOS



**Apresentação:**

Frasco com 2,5 mL.

**Posologia:**

1 gota 1x ao dia.

**Indicação<sup>1</sup>:**

Tratamento da coceira ocular associada à conjuntivite alérgica.

Referências: 1. Bula do produto OPTI®.

# Ster®

acetato de prednisolona 10 mg

○ **Corticosteroide oftálmico.**



**Apresentação:**

Frasco com 5 mL.

**Posologia:**

1 a 2 gotas, 2 a 4x por dia.

**Indicação<sup>1</sup>:**

Inflamações da conjuntiva bulbar ou palpebral, inflamações da córnea e segmento palpebral anterior do globo suscetíveis a esteroides.

Referências: 1. Bula do produto Ster®.

<<< **PÁGINA INICIAL**

# Ster MD

acetato de prednisolona 1,2 mg

## Corticosteroide oftálmico.



### Apresentação:

Frasco com 10 mL.

### Posologia:

1 a 2 gotas, 2 a 4x por dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Inflamações da conjuntiva bulbar ou palpebral, inflamações da córnea e segmento palpebral anterior do globo suscetíveis a esteróides.

Referências: 1. Bula do produto Ster MD.

# Slow-K

cloreto de potássio 600 mg

## Suplementação de potássio.



### Apresentação:

30 comprimidos revestidos de liberação prolongada.

### Posologia:

2 a 3 comprimidos revestidos ao dia, ou conforme orientação médica.

### Indicação<sup>2</sup>:

Utilizado no tratamento ou prevenção de hipocalcemia. Indicado para pacientes que não toleram potássio líquido ou efervescente. Promove a reposição de potássio em usuários de Diamox®.

Referências: 1. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/> 2. Bula do produto Slow K®.

<<< PÁGINA INICIAL

# Thealoz® Duo

Trealose 3% + Hialuronato de sódio 0,15%  
sem conservantes

**Nova geração em Lágrima Artificial<sup>1</sup>,  
que vai além da hidratação,  
único com proteção celular.**



## Apresentação:

Frasco com tecnologia ABAK 10mL -  
300 gotas calibradas.

## Recomendação de Uso:

1 gota em cada olho  
sempre que necessário.

## Indicação<sup>2</sup>:

Solução para proteção, hidratação  
e lubrificação dos olhos.

Referências: 1. Hernandez E et al. Commercially Available Eye Drops Containing Trehalose Protect Against Dry Conditions via Autophagy Induction. J Ocul Pharmacol Ther. 2021;37(7):386-93. 2. Folheto do produto Thealoz® Duo. THEALOZ® DUO: registro 80424140008

# Tobracort®

tobramicina 3 mg/mL +  
dexametasona 1 mg/mL

## Antibiótico oftálmico

MEDICAMENTO  
REFERÊNCIA



## Apresentação:

Frasco com 5 mL e bisnaga com 3,5 g de pomada.

## Posologia:

Colírio: 1 ou 2 gotas a cada 4 a 6 horas.  
Pomada: 3 a 4x ao dia.

## Indicação<sup>2</sup>:

Condições inflamatórias oculares sensíveis a  
esteroides e onde exista infecção ocular bacteriana  
superficial ou o risco de infecção ocular bacteriana,  
uveíte anterior crônica, traumas corneanos e corpo  
estranho, queimadura química ou térmica  
e radiação.

Referências: 1. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/> 2. Bula do produto Tobracort®.

<<< PÁGINA INICIAL

Poder  
que  
inspira  
decide  
transforma  
exala  
carrega

Memento

.....

.....

GENOM

Belavie®

Bio 5®

Climene®

D3caps®

Demedrox®

DK<sub>2</sub>Cal®

Femiane®

Mega Fert®

Mega Mater®

Microvlar®

Miranova®

Mylus®

Neovlar®

Primolut® Nor

Primosiston®

Tess®

Triquilar®

Material destinado exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.

<<< PÁGINA INICIAL

# Belavie®

Único dermocosmético para hidratação íntima vulvar do Brasil contendo ácido hialurônico, manteiga de Karité e dexpanthenol.



BELAVIE HIDRATANTE ÍNTIMO VULVAR. Uso Externo. Nº do processo: 25351.581700/2023-38

**Apresentação**  
Bisnaga com 30 g.

**Recomendação de uso:**

Com a pele limpa e seca, aplique sobre a região externa e a virilha. Use diariamente, 2x ao dia (manhã e noite) ou conforme orientação médica.

**Indicação:**

Secura ou ressecamento vulvar em diversas situações.


**Hidratante Íntimo Vulvar.**

# Bio 5®

Associação de *Bifidobacterium lactis* BI-07 (ATCC SD5220), *Lactobacillus acidophilus* NCFM (ATCC SD5221), *Bifidobacterium lactis* BI-04 (ATCC SD5219) e *Lactobacillus paracasei* Lpc-37 (ATCC SD5275) e *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* HN019 (ATCC SD5674).

**Probiótico com 20 bilhões de culturas ativas.**

**Nova embalagem**



**Apresentação:**

Caixa com 30 sachês de 4 g.

**Recomendação de uso:**

Para adultos (maiores ou igual a 19 anos), consumir 1 sachê ao dia. Dissolva o conteúdo do sachê em aproximadamente 200 mL de água e misture com o auxílio de uma colher até total homogeneização. Ingerir imediatamente após o preparo. Não adicionar o produto a líquidos quentes ou gelados, assim como a bebidas alcoólicas.

**Indicação:**

Podem contribuir com a saúde do trato gastrointestinal.

Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes, lactentes, crianças, pessoas imunocomprometidas ou pessoas acometidas de condição de saúde debilitante grave. Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.

**Referências:** 1. Folheto informativo.  
Nº do registro: 6.6325.0036

<<< PÁGINA INICIAL

# Climene<sup>®</sup>

valerato de estradiol  
acetato de ciproterona

**Associação de estrógeno e progestógeno.**

## Apresentação:

Caixa com 21 comprimidos revestidos.

## Posologia:

1 comprimido ao dia, preferencialmente no mesmo horário. Pausa de 7 dias.

## Indicação<sup>1</sup>:

Terapia de reposição hormonal (TRH) na sintomatologia climatérica, manifestações de involução da pele e do trato urogenital, estados depressivos do climatério, manifestações carenciais devidas à menopausa natural ou hipogonadismo, ooforectomia ou falência ovariana primária em mulheres com útero intacto. Prevenção da osteoporose na pós-menopausa.



Referências: 1. Bula do produto Climene<sup>®</sup>.

# D3caps<sup>®</sup>

colecalfiferol 7.000 UI,  
10.000 UI e 50.000 UI

**Vitamina D.**

## Apresentação<sup>1</sup>:

7.000 UI em embalagem de 30 cápsulas moles.  
10.000 UI em embalagem de 8 cápsulas moles.  
50.000 UI em embalagens de 4 e 8 cápsulas moles.

## Posologia<sup>1</sup>:

A dose e a posologia devem ser definidas a critério médico, de acordo com a condição clínica do paciente.

## Indicação<sup>1</sup>:

Indicado no tratamento auxiliar da desmineralização óssea pré e pós menopausa, do raquitismo, da osteomalácia, da osteoporose e na prevenção de quedas e fraturas em idosos com deficiência de vitamina D.



Referências: 1. Bula do produto.

<<< PÁGINA INICIAL

# Demedrox<sup>®</sup>

acetato de medroxiprogesterona

## Contraceptivo Injetável.



### Apresentação:

Seringa preenchida de 1 mL.



### Posologia:

Uma aplicação em intervalos de 12 a 13 semanas.

### Indicação<sup>1</sup>:

Indicado para mulheres que necessitam de acesso na contracepção injetável.

Referências: 1. Bulo do produto Demedrox<sup>®</sup>.

# DK<sub>2</sub>Cal<sup>®</sup>

carbonato de cálcio, colecalciferol  
(vit. D3) e menaquinona-7 (vit. K2)



## Suplemento de cálcio, vit D3 e vit K2.

### Apresentação<sup>1</sup>:

Embalagem contendo 60 comprimidos revestidos com 600 mg de cálcio, 55 mcg de vitamina K e 5 mcg de vitamina D.

### Posologia<sup>1</sup>:

Para adultos (maior ou igual a 19 anos), consumir 1 comprimido revestido ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

O cálcio auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes. A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes. A vitamina K auxilia na manutenção dos ossos.

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.  
Referências: 1. Folheto do produto.

<<< PÁGINA INICIAL

# Femiane®

gestodeno e  
etinilestradiol

## ○ **Contraceptivo oral.**



### **Apresentação:**

Caixa com 21 drágeas.

### **Posologia:**

1 drágea ao dia,  
preferencialmente no mesmo  
horário. Pausa de 7 dias.

### **Indicação<sup>1</sup>:**

Indicado para as jovens que  
estão iniciando a contracepção.

Referências: 1. Bula do produto Femiane®.

# Mega Fert®

Suplementação pré-concepção

## ○ **Suplemento alimentar.**



### **Apresentação:**

2 frascos com 60 cápsulas moles cada.

### **Recomendação de Uso:**

Homens <sup>1</sup>: Para adultos, consumir 2  
cápsulas ao dia.

Mulher <sup>2</sup>: Para adultos e gestantes,  
consumir 2 cápsulas ao dia.

### **Indicação<sup>1</sup>:**

Suplemento Alimentar para Homens e  
Mulheres em idade reprodutiva. Maiores de  
19 anos e Gestantes.

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.

Referências: 1. HOMEN: Alimento notificado na Anvisa: 25351.027419/2025-16 2. MULHER: Alimento notificado na Anvisa: 25351.027393/2025-14.

<<< PÁGINA INICIAL

# Mega Mater<sup>®</sup>

suplemento vitamínico para gestante com ômega 3, ácido fólico e iodo



## Suplemento alimentar.

### Apresentação:

Caixa com 30 cápsulas moles.

### Recomendação de Uso:

Para gestantes, consumir 1 cápsula mole ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Suplemento alimentar para gestantes.

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.  
Referências: 1. ABRAN. Além da nutrição – O impacto da nutrição materna na saúde das futuras gerações. Carlos A. N. de Almeida, Carolina Pimentel, Eduardo B. da Fonseca editores. 1ª edição, 2019. Eduardo B. da Fonseca editores. 1ª edição, 2019.

# Microvlar<sup>®</sup>

levonorgestrel  
e etinilestradiol



## Contraceptivo oral.



### Apresentação:

Caixa com 21 drágeas.

### Posologia:

1 drágea ao dia, preferencialmente no mesmo horário. Pausa de 7 dias.

### Indicação<sup>1</sup>:

Indicado para mulheres que necessitam de acesso na contracepção oral.

Referência: 1. Bula do produto Microvlar<sup>®</sup>.

<<< PÁGINA INICIAL

# Miranova<sup>®</sup>

levonorgestrel  
e etinilestradiol

◦ **Contraceptivo oral.**

MEDICAMENTO  
REFERÊNCIA<sup>1</sup>



## **Apresentação:**

Caixa com 21 drágeas.

## **Posologia:**

1 drágea ao dia,  
preferencialmente no mesmo  
horário. Pausa de 7 dias.

## **Indicação<sup>1</sup>:**

Contraceção para as mulheres 35+.

Referências: 1. Bula do produto Miranova<sup>®</sup>.

# Mylus<sup>®</sup>

desogestrel

◦ **Contraceptivo oral.**



## **Apresentação:**

Caixa com 28  
comprimidos revestidos.

## **Posologia:**

1 comprimido ao dia, respeitando  
o mesmo horário.

## **Indicação<sup>1</sup>:**

Contraceção.

Referências: 1. Bula do produto Mylus<sup>®</sup>.

<<< PÁGINA INICIAL

# Neovlar<sup>®</sup>

levonorgestrel  
e etinilestradiol

## o **Contraceptivo oral.**



Referências: 1. Bula do produto Neovlar<sup>®</sup>.

### **Apresentação:**

Caixa com 21 comprimidos revestidos.

### **Posologia:**

1 comprimido ao dia, preferencialmente no mesmo horário. Pausa de 7 dias.

### **Indicação<sup>1</sup>:**

Contracepção.

# Primolut<sup>®</sup> Nor

acetato de  
noretisterona

## o **Progestógeno.**



Referências: 1. Bula do produto Primolut<sup>®</sup> Nor.

### **Apresentação:**

Caixa com 30 comprimidos.

### **Posologia:**

15 mg/dia (1 comprimido e meio por dia) durante 10 dias para tratamento da hemorragia disfuncional, ou a critério médico de acordo com quadro clínico da paciente.

### **Indicação<sup>1</sup>:**

Produto exclusivo e indicado para o tratamento do SUA (Sangramento Uterino Anormal), com o principal objetivo de manutenção do tratamento do sangramento moderado e crônico.

# Primosiston®

acetato de noretisterona  
e etinilestradiol

◦ **Associação de estrogênio e progestógeno.**



Referências: 1. Bula do produto Primosiston®.

## **Apresentação:**

Caixa com 30 comprimidos.

## **Posologia:**

1 comprimido, 3x ao dia, durante 10 dias para tratamento da hemorragia uterina disfuncional, ou a critério médico de acordo com quadro clínico de paciente.

## **Indicação<sup>1</sup>:**

Produto exclusivo e indicado para o tratamento do SUA (Sangramento Uterino Anormal), com o principal objetivo de cessar o sangramento agudo e intenso.

MEDICAMENTO  
REFERÊNCIA<sup>1</sup>

# Tess®

acetato de ciproterona  
e etinilestradiol

◦ **Contraceptivo oral.**



Referências: 1. Bula do produto Tess®.

## **Apresentação:**

Caixa com 21 comprimidos revestidos.

## **Posologia:**

1 comprimido ao dia, respeitando o mesmo horário.

## **Indicação<sup>1</sup>:**

Tratamento de distúrbios andrógeno-dependentes (acne, hirsutismo, SOP) e contracepção.

<<< PÁGINA INICIAL

# Triquilar<sup>®</sup>

levonorgestrel e  
etinilestradiol

MEDICAMENTO  
REFERÊNCIA<sup>1</sup>

o **Contraceptivo oral.**



### **Apresentação:**

Caixa com 21 comprimidos revestidos.

### **Posologia:**

1 comprimido ao dia, preferencialmente no mesmo horário. Pausa de 7 dias.

### **Indicação<sup>1</sup>:**

Concepção.

Referências: 1. Folheto do produto. 2. Pereira GA et al. Dietary calcium: strategies to optimize intake. Rev Bras Reumatol 2009;49:164-71.

<<< PÁGINA INICIAL

*Memento*

.....  
**Sistema  
Nervoso  
Central**  
.....

GENOM

Canabidiol  
Nunature®

Cognicx®

Baclon®

Eudok®

Depzel®

Leduo®

Paxtrat®

Seth®

Uninaltrex®

Unitidazin®

Viverdal®

Zolpaz®

Zolpaz SL®

# Cognicx<sup>®</sup>

fosfatidilserina, cobre, selênio, zinco, magnésio, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina E

## ◦ **Suplemento alimentar.**



### **Apresentação:**

Caixa com 60 cápsulas moles.

### **Recomendação de Uso:**

Para adultos (maior ou igual a 19 anos) consumir 2 cápsulas moles ao dia.

### **Indicação<sup>1</sup>:**

Contribui para as funções cognitivas, incluindo memória, capacidade de aprendizado, atenção e concentração.

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.

Referências: 1. Kata-Kataoka A et al. Soybean-derived phosphatidylserine improves memory function of the elderly Japanese subjects with memory complaints. J Clin Biochem Nutr. 2010.47(3):246-55.

	<b>Classe terapêutica</b>	<b>Princípio ativo</b>	<b>Apresentação</b>
<b>BACLON®</b>	Relaxante muscular ação central <sup>2</sup>	baclofeno	10 mg com 20 cpr
<b>CANABIDIOL NUNATURE®</b>	Produto de cannabis <sup>3</sup>	Canabidiol	17,18 mg com 30 mL / 34,36 mg com 30 mL
<b>DEPZEL®</b>	Inibidor de colinesterase <sup>4</sup>	cloridrato de donepezila	5 e 10 mg com 30 cpr
<b>EUDOK®</b>	Antidepressivo ISRS <sup>5</sup>	oxalato de escitalopram	10, 15 e 20mg com 30 cpr
<b>LEDUO®</b>	Antidepressivo IRSN <sup>6</sup>	cloridrato de duloxetina	30 mg x 30 caps 30 mg x 60 caps 60 mg x 60 caps
<b>PAXTRAT®</b>	Antidepressivo ISRS <sup>7</sup>	cloridrato de paroxetina	20 mg com 30 cpr
<b>SETH®</b>	Inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina <sup>8</sup>	cloridrato de bupropiona	150 mg com 60 cpr
<b>UNINALTRESX®</b>	Tratamento da dependência ao álcool e a opioides <sup>9</sup>	cloridrato de naltrexona	50 mg com 30 cpr
<b>UNITIDAZIN®</b>	Antipsicótico <sup>10</sup>	cloridrato de tioridazina	50 e 100 mg com 20 cpr
<b>VIVERDAL®</b>	Antipsicótico atípico <sup>11</sup>	risperidona	1, 2 e 3 mg com 30 cpr
<b>ZOLPAZ®</b>	Hipnótico/sedativo <sup>12</sup>	hemitartrato de zolpidem	10 mg com 30 cpr
<b>ZOLPAZ SL®</b>	Hipnótico/sedativo <sup>13</sup>	hemitartrato de zolpidem	5 mg com 30 cpr sublingual

Referências: 2. Bula do produto Baclon® 3. Bula do produto Canabidiol Nunature® 4. Bula do produto Depzel® 5. Bula do produto Eudok® 6. Bula do produto Leduo® 7. Bula do produto Paxtrat® 8. Bula do produto Seth® 9. Bula do produto Uninaltresx® 10. Bula do produto Unitidazin® 11. Bula do produto Viverdal® 12. Bula do produto Zolpaz® 13. Bula do produto Zolpaz SL®.

*Memento*

.....

**Dor**

.....

**GENOM**

Betaprospan®

Canabidiol  
Nunature®

Cetrolac SL®

Codex®

Dexaneurin®

D3caps®

DK<sub>2</sub>Cal®

Flex-HA®

Flex-OK®

Leduo

Teflan®

<<< PÁGINA INICIAL

# Betaprospan®

dipropionato de betametasona +  
fosfato dissódico de betametasona

**Anti-inflamatório, antialérgico e anti-reumático.**

## Apresentação<sup>1</sup>:

Suspensão injetável 5 mg/mL + 2 mg/mL: embalagem contendo 1 ou 6 ampolas de 1 mL + seringa + agulha.

## Posologia<sup>1</sup>:

A administração é por via intramuscular, com doses que variam de 1 a 2 mL, repetindo-se a terapia se necessário. Para injeção intra-articular, as doses são diferentes, dependendo do tamanho da articulação.

## Indicação<sup>1</sup>:

Tratamento de doenças agudas e crônicas que respondem aos corticoides. Betaprospan® é indicado para: alterações osteomusculares e de tecidos moles, condições alérgicas, condições dermatológicas, doenças do colágeno, tumores malignos e outras condições.



Referências: 1. Bula do produto Betaprospan®.

# Canabidiol Nunature®

cannabis

## Posologia<sup>1</sup>

A literatura recomenda doses entre 2,5 e 25 mg/kg/dia, com aumento gradual. A dose ideal deve ser definida pelo médico, com base na resposta clínica e tolerância do paciente.

Referências: 1. Bula do produto Canabidiol Nunature.

## Apresentação<sup>1</sup>

Solução em gotas.

Embalagem com frasco de 30 mL com 17,18 mg/mL de canabidiol e menos de 0,2% de THC. Cada 1 mL da apresentação contém 50 gotas.

Embalagem com frasco de 30 mL com 34,36 mg/mL de canabidiol e menos de 0,2% de THC. Cada 1 mL da apresentação contém 50 gotas.

<<< PÁGINA INICIAL

# Cetrolac SL<sup>®</sup>

trometamol cetorolaco

## ○ Anti-inflamatório.



Referências: 1. Bula do produto Cetrolac SL<sup>®</sup>.

### Apresentação<sup>1</sup>:

Comprimido contendo 10 mg de trometamol cetorolaco. Embalagem com 10 e 20 comprimidos sublinguais

### Posologia<sup>1</sup>:

Recomenda-se 10 mg a cada 6-8h. Para adultos de até 65 anos a dose máxima diária não deve ultrapassar 60 mg/dia. Já para adultos com mais de 65 anos, não ultrapassar a dose de 40 mg/dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Indicado como anti-inflamatório não hormonal, de potente ação analgésica, usado para tratamento a curto prazo da dor aguda moderada a severa.

# Codex<sup>®</sup>

(fosfato de codeína + paracetamol)

### Classe terapêutica<sup>1</sup>

Combinação de analgésico com opioide<sup>1</sup>.

### Posologia<sup>1</sup>

1 comprimido de 4/4 horas.  
Dores de grau mais intenso: 2 comprimidos de 6/6 horas.  
Dose máxima: 8 comprimidos em 24 horas.

### Apresentação<sup>1</sup>

Comprimido contendo 500 mg de paracetamol + 30 mg de codeína.  
Embalagem contendo 12 ou 36 comprimidos.

### Indicações<sup>1</sup>

Alívio de dores agudas e crônicas de grau moderado a intenso.

Referências: 1. Bula do produto Codex<sup>®</sup>.

<<< PÁGINA INICIAL

# Dexaneurin®

cianocobalamina, clor. piridoxina, clor. de tiamina, clor. de lidocaína monoidratada e fosfato dissódico de dexametasona

**Associação de vitaminas do complexo B, dexametasona e lidocaína.**



## Apresentação<sup>1</sup>:

Embalagem contendo 6 ampolas:  
3 ampolas A: de 2 mL.  
3 ampolas B: de 1 mL.

## Posologia<sup>1</sup>:

Recomenda-se (1 ampola A + 1 ampola B) a cada 2 ou 3 dias.

## Indicação<sup>1</sup>:

Indicado para dorsalgias, lombalgias, cialgias, processos inflamatórios e dores neuropáticas.

Referências: 1. Bula do produto Dexaneurin®.

# D3caps®

colecalfiferol 7.000 UI,  
10.000 UI e 50.000 UI

## Vitamina D.



## Apresentação<sup>1</sup>:

7.000 UI em embalagem com 30 comprimidos moles  
10.000 UI em embalagem com 8 comprimidos moles  
50.000 UI em embalagens com 4 e 8 comprimidos moles.

## Posologia<sup>1</sup>:

A dose e a posologia devem ser definidas a critério médico, de acordo com a condição clínica do paciente.

## Indicação<sup>1</sup>:

Indicado no tratamento auxiliar da desmineralização óssea pré e pós menopausa, do raquitismo, da osteomalácia, da osteoporose e na prevenção de quedas e fraturas em idosos com deficiência de vitamina D.

Referências: 1. Bula do produto D3caps.

<<< PÁGINA INICIAL

# DK<sub>2</sub>Cal<sup>®</sup>

carbonato de cálcio, colecalciferol  
(vit. D<sub>3</sub>) e menaquinona (vit. K<sub>2</sub>)

## Suplemento de cálcio, vit D<sub>3</sub> e vit K<sub>2</sub>.



### Apresentação<sup>1</sup>:

Embalagem contendo 60 comprimidos revestidos com 600 mg de carbonato de cálcio, 55 mcg de vitamina K<sub>2</sub> e 200 UI de vitamina D<sub>3</sub>.

### Posologia<sup>1</sup>:

Recomenda-se consumir 1 comprimido ao dia, junto com uma refeição<sup>2</sup>.

### Indicação<sup>1</sup>:

Suplemento alimentar para manutenção da densidade e manutenção da saúde óssea.

Este produto não é um medicamento. Dispensado de registro - Res. Anvisa nº 27/2010. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Referências: 1. Folheto do produto. 2. Pereira GA et al. Dietary calcium: strategies to optimize intake. Rev Bras Reumatol 2009;49:164-71.

# Flex-HA<sup>®</sup>

colágeno tipo II não desnaturado, ácido hialurônico,  
manganês, vitamina C, vitamina D

## Colágeno tipo II não desnaturado.



 **União com Você**  
Porque saúde é o que realmente importa.

### Apresentação<sup>1</sup>:

Embalagem contendo 30 cápsulas.

### Posologia<sup>1</sup>:

Ingerir 1 cápsula por dia com água pela manhã em jejum.

### Indicação<sup>1</sup>:

Indicado como auxiliar no alívio da dor decorrente da osteoartrite<sup>2</sup>. Auxilia na manutenção da função articular.<sup>2</sup>

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Referências: 1. Folheto informativo Flex-HA. 2. Xu R et al. Undenatured type II collagen and its role in improving osteoarthritis. Ageing Res Rev. 2023;91:102080.

<<< PÁGINA INICIAL

# Flex-OK®

ácido hialurônico + colágeno não desnaturado tipo II (UC-II) +  
óleo de krill + palmitoiletanolamida

## Colágeno não desnaturado tipo II (UC-II).



### Apresentação:

Embalagem com 60 cápsulas.

### Recomendações de Uso:

2 cápsulas 1x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Manutenção da saúde articular, auxiliando na melhora da dor e na rigidez articular.

Referências: 1. Bula do produto Flex OK®.

# LEDUO®

cloridrato de duloxetine

### Classe terapêutica

Antidepressivo  
IRSN.

### Apresentação

30 mg x 30 caps.  
30 mg x 60 caps.  
60 mg x 60 caps.

<<< PÁGINA INICIAL

# Teflan<sup>®</sup>

tenoxicam

**Anti-inflamatório e analgésico.**



Referências: 1. Bula do produto Teflan.

### **Apresentação<sup>1</sup>:**

Embalagem contendo 10 comprimidos revestidos de 20 mg de tenoxicam.

### **Posologia<sup>1</sup>:**

Recomenda-se consumir 1 comprimido ao dia, durante ou logo após uma refeição.

### **Indicação<sup>1</sup>:**

Indicado no tratamento de doenças inflamatórias e dolorosas do sistema musculoesquelético e dismenorreia primária.

<<< PÁGINA INICIAL

Memento

# Dermatologia

GENOM

Acne

Acnen®

Clean Up®

Ison®

Antibiótico

Cef®

Cicatrizes

Silicot®

Nutracêuticos

Lumier age®

Lumier aox®

Lumier force®

Hidratação

Dermon®

Fisiocalm®


Alopécia  
Androgenética

Revipel®

<<< PÁGINA INICIAL

# Acnen<sup>®</sup>

peróxido de  
benzoíla 5%



## Antiacneico tópico.

### Apresentação:

Bisnaga com 20 g.

### Posologia:

Aplicar fina camada de gel nas áreas afetadas, 1 a 2x ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Tratamento da acne leve a moderada.

ACNEN (peróxido de benzoíla 5%) - MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Anvisa Nº 576/2021 AFE nº1.00497-7.  
Referências: 1. Folheto do produto Acnen<sup>®</sup>.

# Clean Up<sup>™</sup>

Higienização facial e equilíbrio  
para a pele oleosa e acneica



## Sabonete facial.

### Apresentação:

Bisnaga com 60 g.

### Recomendação de Uso:

Coloque uma pequena quantidade de Clean up<sup>™</sup> na palma da mão, adicione água e faça uma espuma abundante. Aplique a espuma sobre a pele úmida do rosto, em movimentos circulares, durante aproximadamente 15 segundos e enxague em seguida com água em abundância. Clean up<sup>™</sup> pode ser utilizado como uma espuma de barbear.

### Indicação<sup>1</sup>:

Sabonete facial indicado para peles oleosas e acneicas, que higieniza a pele sem ressecá-la. Clean up<sup>™</sup> purifica e equilibra a pele através de agentes umectantes, com sistema tensoativo de limpeza profunda, removendo as impurezas.

Referências: 1. Resultados dos estudos clínicos RE-TC893-22-82-R1 e RE-UNA093-22-F-1-RO. Data on file.  
CLEAN UP<sup>®</sup>. Uso externo. Nº do processo: 25351.508920/2022-36

<<< PÁGINA INICIAL

# Ison<sup>®</sup>

isotretinoína



**União com Você**  
Porque saúde é o que realmente importa.



## Classe terapêutica

Antiacneico Sistêmico<sup>1</sup>.

## Princípio ativo

isotretinoína de 10 mg e 20 mg.

## Apresentação

Caixa com 30 cápsulas moles.

Referências: 1. Bula do produto Ison<sup>®</sup>.

# Cef<sup>®</sup>

cefalexina 500 mg

## Antibiótico.



## Apresentação:

Caixa com 10 cápsulas duras.

## Posologia:

A cefalexina deve ser administrada por via oral, de acordo com as orientações médicas.

## Indicação<sup>1</sup>:

Tratamento de infecções do trato respiratório, otite média (inflamação no ouvido), infecções na pele e tecidos moles, infecções urinárias e infecções ósseas.

Referências: 1. Bula do produto Cef<sup>®</sup>.

<<< PÁGINA INICIAL

# Revipel®

Minoxidil

## Solução Spray.



Referências: 1. Bula do produto Revipel®

### Apresentação:

Válvula spray contendo 50 mL do produto.

### Posologia:

Aplicar uma dose total de 1 mL no couro cabeludo, sobre a área calva e áreas circunvizinhas, 2x ao dia, iniciando a aplicação no centro da área afetada.

### Indicação<sup>1</sup>:

Revipel® (minoxidil) é indicado no tratamento da alopecia androgênica (calvície hereditária) em homens adultos.

# Silicot®

*polydimethylsiloxane, dimethiconol e hexamethyl disiloxane, cyclopentasiloxane e dimethicone crosspolymer*

## Gel de silicone.



Referências: 1. Folheto do produto Silicot®.  
Silicot: registro 80424140003

### Apresentação:

Bisnaga com 15 g.

### Posologia:

Aplicar uma fina camada cobrindo toda área afetada 2x ao dia ou conforme orientação médica.

### Indicação<sup>1</sup>:

Redução de cicatrizes quando o ferimento estiver completamente fechado, após a remoção de suturas e na prevenção de formação de queloides em cirurgias, traumas e queimaduras.

<<< PÁGINA INICIAL

# Lumier age®

Peptídeos de colágeno (Peptan®), ácido ortosilícico estabilizado em cloreto de colina (Nutricolin®), vitamina C, bisglicinato de Zinco e manganês.

COMBINAÇÃO EXCLUSIVA  
PEPTAN®  
NUTRICOLIN®



**SEM SABOR**  
Infinitas formas de consumir, se adaptando à rotina do consumidor.

## Suplemento alimentar.

### Apresentação:

Caixa com 30 sachês.

### Recomendação de Uso:

Para adultos (maior ou igual a 19 anos) consumir 1 sachê ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>


Auxilia a pele em sua hidratação, firmeza e elasticidade, além de dar suporte para músculos e ossos.

Referências: 1. Barel A et al. Effect of oral intake of choline stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in women with photodamaged skin. Arch Dermatol Res. 2005;297:147-1  
Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada no embalagem.

# Lumier aox®

luteína, zeaxantina, licopeno, vitamina C, vitamina E, selênio, L-histidina, L-alanina, L-arginina

## Suplemento alimentar.



### Apresentação:

Caixa com 30 cápsulas duras.

### Recomendação de Uso:

Para adultos (maior ou igual a 19 anos) consumir 1 cápsula ao dia.

### Indicação<sup>1</sup>:

Auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres e da oxidação celular.

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.

Referências: 1. Instrução Normativa 28 da ANVISA, 2018.

<<< PÁGINA INICIAL

# Lumier force®

silício orgânico (Nutricolin®), biotina, L-Cisteína, vit. D, vit. B3, vit. B5, vit. B6, ômega 3, ferro, cobre e zinco

## Suplemento alimentar.



 100 MG  
NUTRICOLIN®  
POR CÁPSULA

### Apresentação:

Caixa com 30 cápsulas moles.

### Recomendação de Uso:

Para adultos (maior ou igual a 19 anos) consumir 1 cápsula mole ao dia.

### Indicação<sup>1,2</sup>:

Contribui para a manutenção de cabelos e unhas.

Este produto não é um medicamento. Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.

Referências: 1. Instrução Normativa 28 da ANVISA, 2018. 2. Borel A et al. Effect of oral intake of choline stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in women with photodamaged skin. Arch Dermatol Res. 2005;297:147-153.

# Dermon®

dexpantenol, lanolina  
e óleo de amêndoas



## Hidratante dermatológico.



### Apresentação:

Bisnaga com 20 g.

### Recomendação de Uso:

Aplicar uma camada na pele e espalhar delicadamente. Reaplicar sempre que sentir a necessidade de uma hidratação mais intensiva.

### Indicação:

Proteção e hidratação da pele.

DERMON® creme. Nº do processo: 25351.218281/2017-59

<<< PÁGINA INICIAL



## Loção hidratante



### Apresentação:

Frasco com 240 mL.

### Recomendação de Uso:

Aplicar o produto massageando suavemente sobre a pele limpa, de preferência após o banho ou a critério médico.

### Indicação<sup>1</sup>:

Loção hidratante para a pele seca sensível e irritada, proporcionando alívio rápido e duradouro da coceira associada à pele seca, também reduz a vermelhidão e sensação de irritação, deixando-a menos reativa.

Referências: 1. Relatório dos estudos clínicos RE-UNA083-21-ABE-1-R2, RE-UNA083-21-B-1-RO\_vf. Data on file. FISIOCALM<sup>®</sup>. Nº do processo: 25351.064017/2022-50

*Memento*

.....

# Pediatria

GENOM

Antibiótico

Amclavu BD

Antiemético

Ondset ODT

Ondset  
Solução

Solução salina

Respir<sup>®</sup>  
Kids

<<< PÁGINA INICIAL

# Amclavu BD

amoxicilina + ácido clavulânico  
Uso adulto e pediátrico (crianças acima de 2 meses de idade)

## Antibiótico.



Referências: 1. Bula do produto Amclavu BD®.

### Apresentação:

Pó para suspensão oral 80 mg + 11,4 mg/mL: embalagem contendo pó para 70 mL da suspensão reconstituída + seringa dosadora.

### Posologia:

A dosagem depende da idade, peso e função renal do paciente e da gravidade da infecção. A dose diária usualmente recomendada é:

- Dose baixa: 25/3,6 a 45/6,4 mg/kg/dia divididos em 2 doses para infecções leves a moderadas.
- Dose alta: 45/6,4 a 70/10 mg/kg/dia divididos em 2 doses para tratamento de infecções mais graves.

### Indicação<sup>1</sup>:

Indicado para tratamento de infecções em diferentes partes do corpo que são causadas por determinados tipos de bactérias. Infecções do trato respiratório superior. Infecções do trato respiratório inferior. Infecções do trato geniturinário. Infecções da pele e dos tecidos moles.

# Ondset ODT

Cloridrato de ondansetrona di-hidratado

## Antiemético.



Referências: 1. Bula do produto Ondset ODT®.

### Apresentação:

Comprimido orodispersível 4 mg: embalagem contendo 10 comprimidos.

Comprimido orodispersível 8 mg: embalagem contendo 10 comprimidos.

### Posologia:

Uso adulto: 8 mg de ondansetrona 2x ao dia.

Uso pediátrico: Para pacientes maiores de 11 anos, recomenda-se a dose de 4 a 8 mg de ondansetrona (1 a 2 comprimidos de 4 mg). Para crianças de 2 a 11 anos: recomenda-se a dose de 4 mg de ondansetrona (1 comprimido de 4 mg).

### Indicação<sup>1</sup>:

É indicado na prevenção e tratamento de náuseas e vômitos em geral.

# Ondset Solução

Cloridrato de  
ondansetrona di-hidratado

**Única ondansetrona na forma  
farmacêutica líquida aprovada  
no Brasil.**

MEDICAMENTO  
REFERÊNCIA



## Apresentações:

Solução oral 4 mg/5 mL: embalagem contendo 1 frasco com 50 mL de solução oral + 1 copo dosador, ou 1 frasco com 100 mL de solução oral + 1 copo dosador.

## Posologia:

Uso adulto: 8 mg de ondansetrona (10 mL de solução oral) 2x ao dia.

Uso pediátrico: Para pacientes maiores de 11 anos, recomenda-se a dose de 5 a 10 mL de solução oral (equivalentes a 4 mg ou 8 mg de ondansetrona, respectivamente). Para crianças de 2 a 11 anos: recomenda-se a dose de 5 mL de solução oral (equivalente a 4 mg de ondansetrona).

## Indicação<sup>1</sup>:

É indicado na prevenção e tratamento de náuseas e vômitos em geral.

Referências: 1. Bula do produto Ondset Solução Oral<sup>®</sup>.

# Respir<sup>®</sup> Kids

Cloro de sódio 0,9%  
Recomendado para crianças  
acima de 2 anos de idade.

**Pó para solução salina.**



## Apresentação:

Respir Kids completo (frasco 120 mL + 15 sachês) e Respir Kids Refil com 15 sachês.

## Composição:

Cloro de sódio 0,9%.

## Indicação<sup>1</sup>:

Lavagem nasal.

Referências: 1. Bula do produto Respir<sup>®</sup> Kids.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Anvisa Nº 576/2021. AFE nº: 1.00.497-7

<<< PÁGINA INICIAL

*Memento*

.....

# Cardiología

GENOM

Apresolina®

<<< PÁGINA INICIAL

# Apresolina®

Cloridrato de hidralazina

**Anti-hipertensivo vasodilatador direto.**



## Apresentação:

Embalagens contendo 20 ou 60 comprimidos revestidos de 25 mg ou 50 mg.

## Recomendação de uso:

Hipertensão: Dose inicial de 25 mg, 2x/dia, ajustada gradualmente (manutenção: 50 a 200 mg/dia).  
Insuficiência cardíaca congestiva crônica: Dose de manutenção eficaz de 50-75 mg/6h ou 100 mg, 2-3x/dia, após titulação.

## Indicação<sup>1</sup>:

Hipertensão e Insuficiência cardíaca congestiva crônica.

Referências: 1. Bula do Produto Apresolina®

<<< PÁGINA INICIAL



## PENSANDO NO **BEM-ESTAR**, NO **ACESSO** E NA **CONTINUIDADE** DO **TRATAMENTO**

O Programa **União com Você** oferece **benefícios exclusivos** aos participantes cadastrados.



**Maior proteção**  
ao receituário  
médico



**Descontos** que  
permitem maior  
adesão ao tratamento



**Ampla rede  
credenciada**  
ao programa

**O CADASTRO É  
RÁPIDO, FÁCIL  
E SEGURO!**



Drogarias Credenciadas através  
do "Portal da Drogaria"



Central de Atendimento  
**0800 724 67 43**  
de segunda à sexta-feira das 9 às 18 horas

**Acesse:**



# GENOM

Informações  
complementares podem  
ser acessadas através  
do **QR code** ao lado.



**SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO**

**MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE VENDAS UNIÃO QUÍMICA.  
PROIBIDA SUA DISTRIBUIÇÃO.**

Material Digital - Jul/2025